

Tabelle 1: Sortenbeschreibung

Sortenbeschreibung LSV sehr frühe Speisesorten 2009

nach BSA Liste 2009; Züchterangaben ¹⁾ und eigene Beobachtungen ²⁾

Sorte	Reifezeit	Kochtyp	Knollenform	Fleisfarbe	Anfälligkeit für:				Neigung zu:				Keimfrei-	* Über-	* Unter-
					Y-Virus	Krautfäule	Knollenfäule	Schorf	Ziewuchs	Hohlherzigkeit	Wachsrisse	Schwarzfleckigkeit			
1 Berber	2	vf	oval	hellgelb	9	6	4	5	4	4	4	4	6	5/6	5/4
2 Solist	1	vf	rundoval	hellgelb	5	6	4	3	3	4	3	2	4	6/6	5/5
3 Magda ^{1,2)}	1	vf	oval	gelb	1	6	4	4	5	4	4	3	5	5/6	5/4
4 Ingrid ^{1,2)}	2	vf	oval	gelb	-	6	4	4	5	3	3	3	6	6/7	4/3
5 Arcona	1	vf	oval	gelb	7	6	4	5	3	3	3	4	5	5/5	6/4
6 Monica ^{1,2)}	2	vf	langoval	gelb	4	4	5	5	5	3	3	-	4	6/7	4/3

f = festkochend; vf = vorwiegend festkochend;

1 = sehr gering, sehr niedrig

3 = gering, niedrig

5 = mittel

7 = stark, hoch

* Frührodung/Spätrodung

Rot = Verschlechterung im Vgl zum Vorjahr

Grün = Verbesserung im Vgl zum Vorjahr

Tabelle 2: Ergebnisse

LSV sehr frühe Speisekartoffeln 2009

Mittel der Standorte Buir und Kirchherten

Sorte	Stärke%	Sortierung				Ertrag		Marktwareertrag > 35 mm			
		< 35 mm	35-50	50-60	>60 mm	dt/ha	rel.	dt/ha 2009	rel. 2009	rel. 2008	rel. 2007
1 Berber	13,4	3	47	41	8	457	110	442	109	73	102
2 Solist	12,6	2	44	43	12	361	87	356	87	95	99
3 Magda	14,3	3	39	42	16	359	86	350	86	90	-
4 Ingrid	13,1	3	44	37	16	436	104	422	104	99	-
5 Arcona	12,2	2	52	41	5	476	114	466	114	114	-
6 Monika	11,9	1	31	43	25	414	99	409	100	-	-
	12,9	2	43	41	14	417	100	408	100	100= 471 dt/ha	100= 561 dt/ha