

Sortenbeschreibung LSV frühe Speisesorten 2010

nach BSA Liste 2010; Züchterangaben 1⁾; und eigene Beobachtungen 2⁾

Sorte	Reifezeit	Kochtyp	Knollenform	Fleisfarbe	Anfälligkeit für:				Neigung zu:					Keimfrei- digkeit
					Y-Virus	Kraut- fäule	Knollen- fäule	Schorf	Zwie- wuchs	Wachs- risse	Schwarz- fleckigkeit	Über- größen	Unter- größen	
1 Annabelle ^{1,2)}	3/2	f	lang	dunkelgelb	4	6	3	3	4	3	3	5	6	7
2 Gala	3	vf	rundoval	gelb	1	5	3	4	3	3	1	4	6	4
3 Musica ^{1,2)}	3	f/vf	langoval	tiefgelb	2	5	3	3	3	3	3	6	4	6
4 Primadonna	3	vf	oval	gelb	3	6	3	3	3	4	3	5	4	4
5 Sissi	3	f	langoval	tiefgelb	2	4	3	3	3	4	2	6	3	4
6 Francisca	3	vf	oval	gelb	7	6	3	3	3	3	1	3	5	6
7 Merida	3	vf	rundoval	gelb	1	6	3	4	3	4	2	5	4	4
8 Gunda	3	m	oval	hellgelb	5	4	4	3	3	3	2	3	4	4
9 Venezia	3	f	oval	gelb	1	5	3	5	3	3	1	4	4	3
10 Birte	3	vf	rundoval	tiefgelb	1	5	3	4	3	4	1	5	4	5

f = festkochend; vf = vorwiegend festkochend;

1 = sehr gering, sehr niedrig

3 = gering, niedrig

5 = mittel

7 = stark, hoch

LSV frühe Speisesorten 2010

Mittelwert entspricht Standort Buir

	Sorte	Einzelwerte der Standorte		Mittelwert von zwei Standorten								
		MW.-ertrag > 35 mm rel.		Stärke %	Sortierung				Marktwareertrag > 35 mm			
		Buir	Waldniel		< 35 mm	35-50	50-60	> 60 mm	dt/ha 2010	rel. 2010	rel. 2009	rel. 2008
1	Annabelle	96	Standort konnte nicht ausgewertet werden!	11,7	6	45	34	15	506	96	92	100
2	Gala	108		11,8	4	31	45	20	572	108	90	96
3	Musica	115		12,2	3	29	42	25	606	115	110	125
4	Primadonna	106		12,3	4	18	38	41	557	106	100	88
5	Sissi	75		11,5	7	37	36	20	397	75	92	-
6	Francisca	100		11,6	4	37	38	21	526	100	109	-
7	Merida	91		11,7	4	23	28	45	478	91	-	-
8	Gunda	94		13,6	4	36	47	14	495	94	-	-
9	Venezia	84		11,8	6	55	28	11	442	84	-	-
10	Birte	86		12,7	5	39	37	20	456	86	-	-
		100= 528 dt/ha		12,1	5	35	37	23	504	100= 528 dt/ha	100= 505 dt/ha	100= 630 dt/ha

Sortenbeschreibung LSV mittelfrühe Speisesorten 2010

nach BSA Liste 2010; holl. Liste 2007, angepaßt 1) ; Züchterangaben 2) und eigene Beobachtungen 3)

Sorte	Reifezeit	Kochtyp	Knollenform	Fleisfarbe	Anfälligkeit für:				Neigung zu:					Keimfreudigkeit
					Y-Virus	Krautfäule	Knollenfäule	Schorf	Zwiezwuchs	Wachsrisse	Schwarzfleckigkeit	Übergrößen	Untergrößen	
1 Belana	3	f	oval	gelb	1	4	3	4	3	3	3	4	5	2 ³⁾
2 Allians ^{2,3)}	5	f	langoval	tiefgelb	5	4	4	5	3	3	3	6	4	2
3 Krone	4	vf	oval	gelb	2	5	4	3	4	3	1	5	4	3
4 Finessa ^{2,3)}	4	f	langoval	gelb	2	4	5	3	3	3	1	5	3	3
5 Toscana	4	vf	oval	gelb	4	5	3	3	3	3	2	5	3	4
6 Red Fantasy	5	vf	oval	tiefgelb	1	3	3	3	4	3	2	6	3	3
7 Vivi ²⁾	4	vf	oval	hellgelb ³⁾	-	5	3	3	4 ³⁾	4 ³⁾	-	5	3	3
8 Soraya	4	vf	oval	gelb	1	5	3	3	4	3	1	5	3	3
9 Stamm B ²⁾	4	f	langoval	tiefgelb	-	-	-	5	4 ³⁾	-	4	6 ³⁾	4 ³⁾	3
10 Cascada	6	vf	oval	tiefgelb	2	5	3	5	3	5	2	3	5	2
11 Adelina	4	f	oval	gelb	1	4	4	5	4	3	2	5	3	2
12 Marisca ²⁾	4	f	langoval	tiefgelb		5	4	4		-	-	5	5	3

f = festkochend; vf = vorwiegend festkochend;

1 = sehr gering, sehr niedrig

3 = gering, niedrig

5 = mittel

7 = stark, hoch

LSV mittelfrühe Speisesorten 2010

Mittel der rheinischen Standorte

	Sorte	<i>Einzelwerte der Standorte</i>		<i>Mittelwert von zwei Standorte</i>								
		Marktwareertrag < 35 mm rel.		Stärke %	Sortierung				Marktwareertrag > 35 mm			
		Buir	Waldniel		< 35 mm	35-50	50-60	> 60 mm	dt/ha 2010	rel. 2010	rel. 2009	rel. 2008
1	Belana	90	70	12,6	3	41	37	19	426	80	91	99
2	Allians	106	110	10,9	4	42	36	18	564	108	99	98
3	Krone	109	108	12,3	1	15	31	53	568	108	104	80
4	Finessa	76	79	12,6	3	37	37	23	404	77	101	92
5	Toscana	114	114	12,2	3	36	45	16	594	114	111	113
6	Red Fantasy	116	111	12,3	2	22	31	45	594	113	95	92
7	Vivi	117	105	12,1	2	28	36	34	585	111	115	108
8	Soraya	109	100	10,1	2	22	36	40	550	105	102	-
9	Stamm B	92	87	12,7	4	29	42	25	470	89	87	-
10	Cascada	114	117	13,0	4	42	39	15	603	116	-	-
11	Adelina	64	100	11,7	9	46	31	14	414	82	-	-
12	Marisca	93	100	14,0	1	39	45	15	502	97	-	-
		100= 598 dt/ha	100= 448 dt/ha	12,2	3	33	37	26	100= 502 dt/ha		100= 548 dt/ha	100= 637 dt/ha